

## 膵臓癌

対象

療法名

薬品名

投与量

投与方法

時間

投与日(Day) 1コースの期間投与コース

備考

対象	療法名	薬品名	投与量	投与方法	時間	投与日(Day) 1コースの期間投与コース	備考		
切除不能 進行・再発 術前・術後補助	TS-1+GEM療法	ゲムシタビン	800~1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	30min	1.8	ゲムシタビンは60min以上 かけるとSEが増強する		
		TS-1	1.25m <sup>2</sup> 未満 80mg 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満 100mg 1.5m <sup>2</sup> 以上 120mg	経口(分2)		1~14			
	GEM療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	30min	1.8.15	4週間	PD	ゲムシタビンは60min以上 かけるとSEが増強する
	GnP療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	30min	1,8,15	4週間	PD	アブラキサン:特生物
		アブラキサン	125mg/m <sup>2</sup>	DIV	30min				
	GE療法	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	DIV	30min	1,8,15	4週間	PD	ゲムシタビンは60min以上 かけるとSEが増強する
		タルセバ	100mg/day	経口(分1)		1~28			